




โปรแกรมวัคซีนสำหรับไก่



อายุสัตว์	วัคซีนป้องกันโรค			
	นิวคาสเซิล	อหิวาต์เป็ด-ไก่	หลอดลมอักเสบ	ฝีดาษ
1-7 วัน	√			
7 วันขึ้นไป				√
14 วันขึ้นไป			√	
21 วัน	√			
30 วัน		√		
ทุก 3 เดือน	√	√	√	
ทุกปี				√
วิธีให้	หยอดตา/จุ่ม 1-2 หยด	ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ/ใต้ ผิวหนัง (1ml)	หยอดตา/จุ่ม 1-2 หยด	แทงปีก 1-2 ครั้ง

โปรแกรมวัคซีนสำหรับสุกร



อายุสัตว์	วัคซีนป้องกันโรค	
	ปากและเท้าเปื่อย	อหิวาต์สุกร
6 สัปดาห์		√
8 สัปดาห์	√	
12 สัปดาห์	√	√
ทุก 6 เดือน	√	
ทุกปี		√
วิธีให้	ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (2 ml)	ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ/ใต้ผิวหนัง (1ml)



โปรแกรมวัคซีนสำหรับโค-กระบือ



อายุสัตว์	วัคซีนป้องกันโรค				
	FMD (ปากและเท้าเปื่อย)	เฮโมราจิกเซพติซีเมีย (คอบวม)	แอนแทรกซ์ (กาฬ)	แบลดเลก (ไข้ชา)	บรูเซลโลซิส (แท้งติดต่อ)
12 สัปดาห์					√ (ใช้กับโคเพศเมีย)
14 สัปดาห์			√		
16 สัปดาห์	√	√			
20 สัปดาห์	√			√	
ทุก 6 เดือน	√			√	
ทุกปี		√	√		
วิธีให้	ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง (2 ml)	ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (1 ml)	ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง (1 ml)	ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง (5 ml)	ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง (2 ml)





นิวคาสเซิล



ปอดบวม



อหิวาต์

วัคซีนไก่พื้นเมือง



โปรแกรมวัคซีนสำหรับเปิด ห่าน

อายุ	วัคซีนที่ใช้	
	กาฬโรคเปิด	อหิวาต์เปิด-ไก่
3-4 สัปดาห์	√	√
10-12 สัปดาห์	√	√
ทุก 3 เดือน		√
ทุกปี	√	
วิธีให้	ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (1 ml)	ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ/ ใต้ผิวหนัง (1 ml)



หยอดตา



หยอดจมูก



แทงปีก



ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

วิธีการทำวัคซีน

โปรแกรมวัคซีนสำหรับแพะ แกะ

อายุ	วัคซีนที่ใช้		
	ปากและเท้าเปื่อย	แอนแทรกซ์	แบลดเลก
12 สัปดาห์	√		
14 สัปดาห์		√	
15 สัปดาห์	√		
20 สัปดาห์			√
ทุก 6 เดือน	√		√
ทุกปี		√	
วิธีให้	ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง	ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง	ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง
	(2 ml)	(0.5 ml)	(2.5 ml)

ปฏิทินการทำวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ประจำปี

ไก่	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	หมายเหตุ
นิวคาสเซิล	/			/			/			/			ทำซ้ำทุก 3 เดือน
หลอดลมอักเสบ	/			/			/			/			ทำซ้ำทุก 3 เดือน
อหิวาต์เปิด-ไก่		/			/			/			/		ทำซ้ำทุก 3 เดือน
ฝีดาษ					/								ทำซ้ำทุกปี
เปิด ห่าน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	หมายเหตุ
กาฬโรคเปิด				/						/			ทำซ้ำทุก 6 เดือน
อหิวาต์เปิด-ไก่		/			/			/			/		ทำซ้ำทุก 3 เดือน
สุกร	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	หมายเหตุ
ปากและเท้าเปื่อย				/						/			ทำซ้ำทุก 6 เดือน
อหิวาต์สุกร										/			ทำซ้ำทุกปี
โค-กระบือ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	หมายเหตุ
ปากและเท้าเปื่อย				/						/			ทำซ้ำทุก 6 เดือน
แบลดเลก				/						/			ทำซ้ำทุก 6 เดือน
ดอบวม	/												ทำซ้ำทุกปี
แอนแทรกซ์	/												ทำซ้ำทุกปี
แพะ-แกะ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	หมายเหตุ
ปากและเท้าเปื่อย				/						/			ทำซ้ำทุก 6 เดือน
แบลดเลก				/						/			ทำซ้ำทุก 6 เดือน
แอนแทรกซ์	/												ทำซ้ำทุกปี

หมายเหตุ ช่วงเวลาในการทำวัคซีนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ และความพร้อมของตัวสัตว์